



CONTROLLO DEI PATOGENI

CRITTOGAME: CERCOSPORIOSI, CLADOSPORIOSI, FUSARIOSI

Per quanto riguarda il controllo dei patogeni (funghi, virus, batteri,...) si ricorre principalmente a prodotti rameici e zolfo. In tale senso è importante ricordare il limite dei 6 kg di rame ad ettaro per anno fissato nella normativa comunitaria. Nei prodotti rameici i tempi di carenza oscillano fra i 3 e i 20 giorni. Per quanto riguarda lo zolfo i tempi di carenza sono all'incirca di 5 giorni. Si ricorda l'incompatibilità dello zolfo con prodotti quali gli oli minerali. Stessa nota per prodotti rameici quali la poltiglia bordolese ed alcuni idrossidi. Si rammenta comunque l'importanza di consultare sempre con attenzione l'etichetta.

Di seguito sono riportati alcuni dei principali patogeni e i relativi sistemi di controllo:

CRITTOGAME	
CERCOSPORIOSI	
Colture interessate: Bietola	
Interventi preventivi: Eliminazione residui colturali	
Trattamenti: Prodotti Rameici	

CRITTOGAME	
CLADOSPORIOSI	
Colture interessate: Melone, Pomodoro, Zucchini	
Trattamenti: Prodotti Rameici	

CRITTOGAME	
FUSARIOSI	
Colture interessate: Cavoli, Fagioli, Fragole, Piselli, Cucurbitacee, Solanacee (marciume secco)	
Interventi preventivi: Eliminazione residui colturali, Solarizzazione	
Trattamenti: Trichoderma harzianum <ul style="list-style-type: none"> • Trattamento in presemina del terreno • Trattamento delle radici delle piantine 	

(maggio 2009)

Vedi anche:

-Controllo dei patogeni: alternariosi, antracosi, botrite

-Controllo dei patogeni: oidio, peronospora

-Controllo dei patogeni: piede nero-ernia, rizottoniosi, ruggine

-Controllo dei patogeni: sclerotinia, septoriosi, tuberosità radicale, verticilloso

-Controllo dei patogeni: batteriosi, virosi



Regione Lombardia

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali
PSR 2007-2013 Direzione Generale Agricoltura